

Autoevaluación

1. Respecto al Asma Ocupacional (AO), sólo una de las siguientes afirmaciones es cierta:
 - a. Su mecanismo de producción puede ser inmunológico o no inmunológico
 - b. Su diagnóstico se establece con la historia clínica sugestiva y la exposición a un agente con capacidad conocida de provocar AO
 - c. Si el agente sospechoso es un compuesto de bajo peso molecular su implicación puede demostrarse con una prueba cutánea positiva

2. Todos los siguientes criterios menos uno son ciertos para el diagnóstico del Asma Exacerbada por el Trabajo (AET). Indique el que **no** es:
 - a. Su aparición puede ser tanto previa como coincidente con la exposición laboral
 - b. Requiere una relación temporal entre exposición y empeoramiento de síntomas
 - c. En el trabajo deben existir condiciones que puedan ser causa del empeoramiento
 - d. El diagnóstico exige excluir el de Asma Ocupacional (AO)
 - e. El análisis del flujo espiratorio y los estudios de inflamación permiten distinguir claramente el AET del AO

3. En relación con los criterios diagnósticos de las neumonías intersticiales idiopáticas, la revisión de 2013 del Consenso 2002 introduce todos menos uno de los cambios siguientes. Indíquelo:
 - a. Se elimina el término alveolitis fibrosante fibrogénica
 - b. Se excluyen los cuadros histológicos de la neumonía organizativa aguda y de la neumonía intersticial bronquiocéntrica
 - c. Se acepta la neumonía intersticial no específica idiopática como entidad clínica definida.

4. Entre las siguientes frases hay una errónea. Indíquela
 - a. El mejor conocimiento actual de las características clínicas, radiológicas e histológicas de las neumonitis por hipersensibilidad suele permitir su distinción de las neumonías Intersticiales no específicas y de la fibrosis pulmonar idiopática
 - b. Aunque algunos pacientes muestran simultáneamente hallazgos radiológicos sugestivos de diferentes neumonías intersticiales idiopáticas (NII), la histología de la biopsia es única y facilita la identificación
 - c. En la valoración diagnóstica de las NII se investigará siempre la historia familiar de enfermedad intersticial
 - d. En la sistemática diagnóstica de las NII debe incluirse análisis serológicos para descartar enfermedades del colágeno
 - e. Hasta en un 30% de casos con cuadro histológico de neumonitis por hipersensibilidad no se alcanza a determinar el agente causal

5. En Estados Unidos de America fallecen actualmente por EPOC más mujeres que hombres:
 - a. Cierto
 - b. Falso

6. Estudios recientes indican que (señale la frase falsa):
 - a. la mujer fumadora presenta un descenso anual del FVE_1 similar al del hombre
 - b. ante síntomas similares, la EPOC fue un diagnóstico primario más frecuente en hombres que en mujeres
 - c. el 73% de pacientes con criterios de EPOC fue infradiagnosticado
 - d. el infradiagnóstico fue más frecuente en la mujer

7. La tos se inicia generalmente por estimulación de estructuras inervadas por el vago y localizadas principalmente en (indique el que **no** es):

- a. oído externo y tímpano
- b. faringe inferior
- c. laringe
- d. arbol bronquial
- e. parénquima pulmonar

8. Las escalas de disnea se correlacionan mucho mejor con:

- a. la prueba de 6 min de marcha
- b. el FEV₁ del paciente

9. La apariencia de la hemoptisis puede sugerir su causa (relacione **aspecto** con **causa**):

<i>Aspecto</i>	<i>Causa</i>
a. Sangre franca	
	1. Insuficiencia cardiaca
b. Rosado espumoso	
	2. Tumor
c. Estrías sanguinolentas en esputo blanquecino	
	3. Infeccion bacteriana
d. Herrumbroso purulento	
	4. Embolismo pulmonar

10. Las complicaciones pulmonares de la cirugía son

- a. Poco (<2%) frecuentes.
- b. Algo menos frecuentes (3-4%) que las cardiovasculares
- c. Tan o más frecuentes (≥5%) que las cardiovasculares

11. De las frases siguientes indique la **falsa**:

- a. Una de cada cuatro muertes ocurridas en los seis primeros días del postoperatorio se debe a complicación respiratoria
- b. El 20-25% de los pacientes postoperados que sufren una complicación respiratoria fallece en los primeros 30 días tras la cirugía.
- c. La obesidad es un importante factor de riesgo de complicación postoperatoria

12. De los siguientes factores de riesgo de complicación postoperatoria, indique el que muestra una mayor Odds-Ratio (Riesgo relativo):

- a. Edad superior a 80 años
- b. Tabaquismo de >40 paquetes/año
- c. FEV₁ <1L
- d. PO₂ <75mmHg

RESPUESTAS de la Autoevaluación

1. A
2. E
3. B
4. B
5. A
6. A
7. E
8. A
9. A+4, B+1, C+2, D+3
10. C
11. C
12. D

